

برنامه غذایی پسته با محصولات به رشد کویر رفسنجان

نوع کود مصرفی	زمان مصرف	فصل خواب زمستانه	تورم جوانه ها	مرحله ارزشی شدن	شروع در شدن دانه	مرحله نیم مغز	پس از برداشت
سولفات آهن/روی/منگنز	۵۰-۱۲۰ کیلوگرم در هکتار همراه کود دامی						
فروت ست			۲ لیتر در هزار محلول پاشی				۲ لیتر در هزار لیتر آب محلول پاشی
نیترات کلسیم			مصرف خاکی ۷۰-۱۲۰ کیلوگرم در هکتار				مصرف خاکی ۷۰-۱۲۰ کیلوگرم در هکتار
آمینوکا				محلول پاشی ۲ لیتر در هزار			
آمینو میکرومکس			محلول پاشی ۲ لیتر در هزار				
سیلیکا					۲-۳ لیتر در هزار محلول پاشی		
اوره فسفات			۷۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار آبیاری				
فسفوکا/فسفوماکس				۱-۲ لیتر در هزار محلول پاشی			۱-۲ لیتر در هزار محلول پاشی
۲۰-۲۰-۲۰				۲۰-۲۰-۲۰ ۵۰-۱۰۰ کیلوگرم در هکتار			
آلی گرانوله (۶-۳-۳)		۳۰۰-۴۰۰ کیلوگرم در هکتار همراه کود دامی					
سولوپتاس					۱۰۰-۲۰۰ کیلوگرم در هکتار همراه آب آبیاری		
سیوید ماکس				محلول پاشی ۲-۳ کیلوگرم در هزار			

توصیه های لازم در استفاده از برنامه غذایی

- ❖ استفاده از هر نوع کود به هر میزان، فقط با توجه به آزمون خاک توصیه می شود زیرا کمبود ها و بیش بودها با توصیه اصولی قابل رفع شدن هستند و استفاده بدون تشخیص صحیح می تواند باعث ایجاد مسمومیت و افزایش هزینه های کشاورز شوند.
- ❖ برنامه غذایی ارائه شده به صورت کلی بوده و توصیه می گردد در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، با کارشناسان بخش فنی شرکت به رشد کویر رفسنجان تماس حاصل فرمایید.
- ❖ مقادیر ذکر شده برای یک برنامه جامع تغذیه ای و برای برداشت حداکثر محصول در نظر گرفته شده است، اما در صورتی که حتی یک یا قسمتی از این برنامه اجرا شود یقیناً اثرات مطلوب نسبی را در بر خواهد داشت.
- ❖ زمان های در نظر گرفته شده در جدول از نظر جذب عناصر بهترین زمان است اما در صورتی که بعد از زمان های ذکر شده نیز محلول پاشی صورت گیرد می تواند مفید و موثر باشد.
- ❖ محلول پاشی باید در هوای آرام انجام پذیرد. بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا بعد از ظهر است که رطوبت هوا به بالاترین میزان ممکن رسیده و از شدت نور خورشید نیز کاسته شده باشد.
- ❖ جهت جلوگیری از گیاه سوزی، از محلول پاشی در هنگام ظهر و هوای گرم اجتناب شود.
- ❖ جهت اختلاط کودها با یکدیگر حتماً با کارشناسان ما در ارتباط باشید و در صورت امکان تست اختلاط قبل از مصرف انجام شود.
- ❖ استفاده از کودهای تک عنصری در صورت وجود علائم کمبود عناصر آهن، روی و منگنز جهت رفع علائم کمبود این عناصر غذایی توصیه می شود.