

آمینوزینک (کلات روی + آمینواسید)

SL هایع

AMINOZINC

(Zinc Chelate + Amino Acid)



بهترین کیفیت ماکزیم عملکرد



1 L 5 L

ملاحظات

مقادیر توصیه شده، عمومی بوده و بسته به نوع، میزان کمبود، سن و اندازه گیاه، میزان محصول و... قابل تغییر است. در صورت نیاز، تکرار محلول پاشی، تا ۳ نوبت با فاصله حداقل ۲۰ روز، قابل تکرار است. در طول دوره گلدهی و ارزنی شدن میوه ها، از محلول پاشی اجتناب شود. از محلول پاشی در ساعات گرم روز و زیر نور شدید آفتاب اجتناب شود.

Product Overview

معرفی محصول

آنالیز (Analysis): روی کلات شده (Zinc Chelate) : 8%

آمینواسید (Amino Acid) : 5% ازت (N) : 6% ماده آلی (OM) : 5%

آمینوزینک، کود مایع کلات روی به همراه آمینو اسید و ازت است. روی در جلوگیری از ریزش، سلامت و باز شدن به موقع جوانه ها، گلدهی، گرده افشانی و تلقیح مناسب، تشکیل تخمک، تولید مثل، میزان باردهی، کیفیت خوشه بندی، کمیت و کیفیت میوه نقش به سزایی دارد. روی، با بهبود متابولیسم هورمون اکسین و آنزیم ها، موجب افزایش میزان رشد سلول ها و در نتیجه افزایش رشد شاخه ها و جلوگیری از کلروز و کوچکی و باریکی برگ ها در گیاه می گردد.

مزایای محصول

کلات بودن روی، به همراه استفاده از آمینو اسید ارگانیک و ازت در فرمولاسیون تولید آمینوزینک، با تحریک هورمون ها و آنزیم های گیاهی، موجب جذب و انتقال و تاثیر سریع این محصول در سلول های اندام های گیاه می گردد. با توجه به تثبیت و جذب بسیار پایین اکثر ترکیبات روی در خاکهای قلیایی، آهکی و شور کشور ما، محلول پاشی، موثرترین و مقرون به صرفه ترین راه جبران کمبود این عنصر در گیاه است. آمینوزینک، قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کودها را دارد.

توصیه مصرف

محلول پاشی: ۲ - ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب/هکتار.

بذر مال: ۱ لیتر برای ۱۰۰ کیلو بذر.